




# SCHAWK!

 <b>Dow AgroSciences</b>
<b>Package MID :</b> 99079189 1801
<b>Trade Name :</b> BROADWAY STAR
<b>Country :</b> SWEDEN
<b>Size :</b> 145X95MM
<b>Artwork Type :</b> 1.06KG BOOKLET LABEL
<b>Specification :</b> EU 582
<b>Standardisation Level :</b> 3
<b>Printer :</b> EMEA - CCL LABEL ITALY
<b>Packing Location :</b> EMEA - TORRE SRL TORRINIERI (F456/F500)
<b>Ticket No :</b> 611513A01/529817
<b>Date :</b> 09-FEB-18
<b>Proof Cycle No :</b> 1
<b>COLOUR REFERENCES</b> Number of Colours used: 4


Page 1



# SCHAWK!



Dow AgroSciences

**Package MID :** 99079189 1801  
**Trade Name :** BROADWAY STAR  
**Country :** SWEDEN  
**Size :** 145X79MM  
**Artwork Type :** 1.06KG BOOKLET LABEL  
**Specification :** EU 582  
**Standardisation Level :** 3  
**Printer :** EMEA - CCL LABEL ITALY  
**Packing Location :** EMEA - TORRE SRL TORRINIERI (F456/F500)

**Ticket No :** 611513A01/529817  
**Date :** 09-FEB-18  
**Proof Cycle No :** 1

### COLOUR REFERENCES

Number of Colours used: 1

Black

# EU 582 CCL ITALY

Page 2

Page 3

w. 42 mm      w. 42 mm

7 mm    7 mm

6 mm

6 mm

**Bruksanvisning**  
Broadway Star är en systemisk herbicid för användning i höstvete, höstråg, höstrågsvete och vårsvete. Broadway Star är en bladverkande produkt med effekt på ett brett spektrum av gräs- och örtogräs som kvickrot, åkerven, flyghavre, renkavle, viol, snärjmåra, blåklint, vallmo, åkerbinda, spillraps, lomme, våtarv och baldersbrå. Broadway Star kan inte användas i stråsådd med insådd av gräs, klöver eller baljväxter.

**Verkningsätt**  
Broadway Star innehåller ALS-hämmarna pyroxosulam och florasulam. Tillväxten avstannar omedelbart efter upptag i plantan. Synliga symptom uppträder några veckor efter behandling.

**Klimatförhållanden vid användning**  
Broadway Star kan användas när temperaturen är 6°C eller högre och ogräsen är i aktiv tillväxt. För att uppnå bästa effekt, behandla på små ogräs. Behandla inte en stressad gröda. Stress kan uppstå av flera orsaker som frost, vattenmättad jord, näringsbrist, sjukdomar, skadedjur m.m.. Behandling av en stressad gröda med Broadway Star kan vid enstaka tillfällen ge grödan en övergående ljusfärgning. Detta påverkar normalt inte skörden.

**Doserings- och användningstabell**

Gröda	BBCH	Dosering, g/ha	Ogräs och förväntad effekt		
			95-100%	85-94%	70-84%
Vårsvete	20-32	150 + PG26N	Flyghavre, lomme, åkersenap, våtarv, penningört	Snärjmåra, rödplister, baldersbrå, åkerbinda, kornvallmo, åkerviol	Kvickrot <sup>1</sup> , renkavle, trampört
Höstsvete Rågsvete Råg	20-32	160 + PG26N	Åkerven, lomme, våtarv	Snärjmåra, rödplister, åkerviol, baldersbrå, kornvallmo	Blåklint, kvickrot <sup>1</sup> , renkavle, trampört, penningört
		215 + PG26N	<b>Ovan listade</b>	<b>Ovan listade + sandlosta, renkavle</b>	Trampört, engelskt rajgräs, kvickrot <sup>1</sup> , penningört, blåklint
		265 + PG26N	<b>Ovan listade + raps, snärjmåra, åkersenap, penningört</b>	Kvickrot <sup>1</sup> , åkerviol, sandlosta, renkavle, engelskt rajgräs, trampört, åkerriktika, rödplister, baldersbrå, kornvallmo, rödplister,	Vitgröe, blåklint, harkål, åkerförgätmigej, vanlig korsört, åkerpilört

<sup>1</sup>Broadway Star har effekt på kvickrot vid behandling i kvickrotens 3-4 bladstadie. Broadway Star bör normal följas upp med en efterföljande behandling med en produkt innehållande glyfosat efter skörd för att uppnå långtidseffekt.

**Delad behandling med Broadway Star ger 85-94% kontroll av sandlosta i höstvete, rågsvete och råg**

- 1:a behandlingen: 105 g/ha + PG26N, tidig vår när ogräsen är i aktiv tillväxt.
- 2:a behandlingen: 105 g/ha + PG26N 10-14 dagar (minst 10 dagar) efter 1:a behandlingen och ej senare än grödans stadie BBCH 32.

**Additiv**  
Broadway Star ska användas tillsammans med PG26N. Se etikett för PG26N.

**Jordarter**  
Broadway Star kan användas på alla jordarter.

**Regnfasthet**  
Broadway Star är regnfast 1 timme efter behandling.

**Blandningar**  
Broadway Star kan inte blandas med produkter innehållande fenoxaprop eller stråförkortningsmedel innehållande trinexapac, mepiquat, prohexadion eller ethephon. Ett minsta avstånd på 7 dagar mellan behandlingarna rekommenderas. Broadway Star bör dessutom inte blandas med Bumper<sup>®</sup> 25 EC/ Tiit<sup>®</sup> 250 EC/ Bolt<sup>®</sup> XL då det kan ge utfällningar.

**Omsådd**  
Stråsådd, majs och gräs kan etableras 6 veckor efter plöjning eller liknande djupbearbetning.

**Efterföljande gröda**  
Inga restriktioner för efterföljande gröda.

**Rekommenderad skyddsutrustning vid användning**  
**Vid beredning/rengöring:** Skyddsglasögon, överdragsbyxor, skyddshandskar och gummistövlar.  
**Vid sprutning:** Med sprutbommen mindre än 1 meter över marken, monterad på traktorn eller liknande, samt när arbetet utförs utanför eller utan förarhytt används överdragsbyxor, skyddshandskar och gummistövlar. Vid sprutning med sluten hytt (ventilationsanläggning ska vara avstängd) ska det inte användas särskild skyddsutrustning.  
Vid annan appliceringsmetod hänvisas till Arbetsmiljöverkets broschyrer "Ditt grundskydd mot växtskyddsmedel".

**Sprutteknik och vätskemängd**  
Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Broschyren finns på [www.sakertvaxtskydd.se](http://www.sakertvaxtskydd.se). Broadway Star ska appliceras med en växtskyddsspruta, som är kalibrerad och uppfyller den standard och specifikation som uppger av sprutillverkaren. Rekommenderad mängd vatten vid behandling är 100 till 300 liter vätskemängd per hektar. Använd en sprutteknik som är anpassad för ogräsets storlek och bladställning. För att säkerställa god nedträngning i tätta grödor rekommenderas låg hastighet och minst 200 vätskemängd l/ha.

w. 79 mm      w. 79 mm

# SCHAWK!



Dow AgroSciences

**Package MID :** 99079189 1801  
**Trade Name :** BROADWAY STAR  
**Country :** SWEDEN  
**Size :** 145X79MM  
**Artwork Type :** 1.06KG BOOKLET LABEL  
**Specification :** EU 582  
**Standardisation Level :** 3  
**Printer :** EMEA - CCL LABEL ITALY  
**Packing Location :** EMEA - TORRE SRL TORRINIERI (F456/F500)

**Ticket No :** 611513A01/529817  
**Date :** 09-FEB-18  
**Proof Cycle No :** 1

### COLOUR REFERENCES

Number of Colours used: 1

Black

## EU 582 CCL ITALY

Page 4

w. 42 mm      w. 42 mm

7 mm    7 mm

6 mm

6 mm

#### Beredning av sprutvätska

Se alltid till att sprutan är ordentligt rengjord från rester och beläggningar samt kontrollerad före det att tillredning av sprutvätskan påbörjas. Detta gäller särskilt om sprutan har använts för sprutning i andra grödor.

Sprutvätskan ska vara under omrörning vid tillredning fram till sprutningsarbetet är avslutat. Fyll halva behållaren med vatten och därefter tillförs önskad mängd preparat.

**Preparatpåfyllare:** Vid användning av preparatpåfyllare, fylls halva behållaren med vatten och därefter tillförs önskad mängd av preparat. Därefter sugs vätskan upp i sprutan samtidigt som rent vatten tillförs.

Efteråt sköljs preparatpåfyllaren, och eventuellt tomt emballage. Upprepa processen med att öppna och stänga preparatpåfyllarens bottenventil tills lina synliga spår av preparatet finns.

**Preparatdosering:** Vid användning av preparatdosering hänvisas användaren till sprutillverkarens rekommendationer.

#### Invändig rengöring av sprututrustning vid avslutad/byte av sprutning

**Observera!** Eventuell skölvattentank bör vara av sådan storlek att sprutvätskan kan utspädas minst 50 gånger. Var speciellt uppmärksam på att få rengjort alla invändiga detaljer grundligt. Aktivera alla slangar och ventiler samt öka trycket så att övertrycksventilen från det självrengörande filtret utlöser.

Detta gäller under alla rengöringsprocesser.

- Starta med att tömma sprutan helt innan rengöring. Rester av sprutvätskan samt skölvattnet ska sprutas ut på den behandlade arealen.
- Genom de invändiga spolmunstyckena tvättas spruttanken invändigt, skölj även slangar och ramp strax efter sprutarbetets avslutning med rent vatten. Detta ska upprepas 2-3 gånger.
- Fyll vatten i tanken – 10-15% av tankkapaciteten (100-150 liter vatten i en 1000 liters tank) och tillsätt 0,5 liter All Clear<sup>1</sup> Extra eller liknande produkt i rekommenderad dosering/ 100 liter vatten. Spruta lite av skölvattnet ut genom slangar, ramp och munstycke så de blötlägges. Låt tankspolmunstycke vara i drift under minst 15 minuter. Töm därefter sprutan genom ramp och munstycken över tidigare besprutad areal under körning.
- Munstycke, filter och silar monteras av och tvättas i vatten, tillsätt 50 ml All Clear Extra/ 10 liter vatten.
- Skölj tanken och alla slangar grundligt i 5 minuter med rent vatten. Skölvattnet sprutas ut genom ramp och munstycke.

#### Utvändig rengöring av sprutor

Rengöring av spruta och traktor (sprutekipage) måste göras på det behandlade området, biobädd eller på en påfyllnings/vättplats med uppsamling av tvättvatten i flytgödselbehållare eller annan behållare. Rengöring på det behandlade området kräver växtskydds-spruta försedd med tvättutrustning och att vattenkapaciteten är tillräcklig.

#### Resistensstrategi

Produktnamn	Typ	Verksam substans	HRAC grupp	Risk för utveckling av resistens
Broadway Star	herbicid	Pyroxsulam Florasulam	B	Hög

Dow AgroSciences rekommenderar en stark anti-resistens strategi. För att undvika resistensutveckling rekommenderar Dow AgroSciences, att det generellt används ogräsmiddel med olika verknings sätt i växtföljden. – gärna i blandningar. Det rekommenderas ytterligare att ha både vår och höstsådda grödor i växtföljden. Speciellt i samband med reducerad jordbearbetning bör dessa rekommendationer följas noggrant. Var medveten om att bristande effekt (om produkten för övrigt har använts på rätt sätt) kan bero på begynnande resistensutveckling.

#### Lagring

Förvaras frostfritt och i tillsluten förpackning

#### Tomma emballage

De tomma flaskorna sköljs ordentligt med vatten minst tre gånger. Skölvattnet håller man i sprutan. Väl rengjorda och torra plastförpackningar med avtagen skruvkork ska enligt överenskommelse lämnas för energiutvinning till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar.

Observera att förpackningarna ska sköljas ordentligt minst 3 gånger och ställas upp och ned under minst 30 sekunder för avrinning. Företaget är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar ([www.svepretur.se](http://www.svepretur.se)).



Dow AgroSciences Sverige AB er medlem av Svenskt Växtskydd.

<sup>1</sup> Varumärke - Adama  
<sup>2</sup> Varumärke - Syngenta  
<sup>3</sup> Varumärke - Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.  
<sup>4</sup> Varumärke - FMC Corporation

w. 79 mm      w. 79 mm

Page 5

# SCHAWK!

 <b>Dow AgroSciences</b>
<b>Package MID :</b> 99079189 1801
<b>Trade Name :</b> BROADWAY STAR
<b>Country :</b> SWEDEN
<b>Size :</b> 145X95MM
<b>Artwork Type :</b> 1.06KG BOOKLET LABEL
<b>Specification :</b> EU 582
<b>Standardisation Level :</b> 3
<b>Printer :</b> EMEA - CCL LABEL ITALY
<b>Packing Location :</b> EMEA - TORRE SRL TORRINIERI (F456/F500)
<b>Ticket No :</b> 611513A01/529817
<b>Date :</b> 09-FEB-18
<b>Proof Cycle No :</b> 1
<b>COLOUR REFERENCES</b> Number of Colours used: 4


Page 6

